

LÄNSSTYRELSEN
Stockholms län
Naturvårdsenheten
1:e byråingenjör
Björn Hjernquist

BESLUT

1(5)

Datum

Beteckning

1982-03-12
Ert datum

11.122-712-81
Er beteckning 0188

08 - 785 51 39

huvud
beakt.

Enligt sändlista

LÄNSSTYRELSEN
1982-03-12
Annot

Länets naturvårdsenheten

26 4 82

Beslut om fågelskyddsområdet Abborren vid Understen,
Singö socken, Norrtälje kommun
(2 bilagor)

Stockholms läns landsting har under åren 1974-75 genomfört en inventering av länets kustfågelbestånd. Inventeringen har sammanställts och redovisats i rapporten "Natur i Stockholms län - 4. Kustfågelnarna" (1980).

Med detta underlag och det datamaterial som finns på regionplanekontoret har länsstyrelsen under 1981/82 granskat behovet av fågelskydd i Stockholms läns skärgård.

Samråd har ägt rum med statens naturvårdsverk och Norrtälje kommun. Markägaren har godkänt förslaget.

Beskrivning av fågelskyddsområdet

<u>Namn</u>	Fågelskyddsområdet Abborren
<u>Kommun</u>	Norrtälje
<u>Socken</u>	Singö
<u>Fastighet</u>	Singö-Tranvik 6:2 (del av)
<u>Markägare</u>	Emil och Sally Kjällberg
<u>Areal</u>	Ca 7,1 ha
<u>Därav landareal</u>	Ca 0,8 ha
<u>Lägesbeskrivning</u>	Ekonomiska kartan blad 12J 6e Ön Abborren ligger ca 7 km NO om Singö i Ålands hav
<u>Naturvårdsförvaltare</u>	Länsstyrelsen

Enligt jordbruks-
departementets diarium
har besvär inte anförts
över detta beslut.

Datum 820428
Registratör/Sign.

Bie

LÄNSSTYRELSEN
Stockholms län
Naturvårdsenheten
1:e byråingenjör
Björn Hjernquist
08 - 785 51 39

BESLUT

Datum
1982-03-12
Ert datum

Beteckning
11.122-712-81
Er beteckning 0188

Grund för beslutet

Abborren är en trädlös klippö nordost om Singö i Ålands hav. På ön finns länets nordligaste förekomst av tordmule och sillgrissla. Tordmulekolonin är dessutom en av de största i länet med ca 50 par. På ön finns vidare förekomst av bl a ejder, sill- och gråtrut samt en kolonitobisgrissla med över 30 par.

Tordmulen häckar längs kusterna av norra Atlanten. I Sverige förekommer den i Östersjön. På västkusten har två kolonistationer nyligen skett. Ungefär 4 000 par torde finnas i Sverige i dag, varav ca 1 300 par i Stockholms skärgård. Östersjöpopulationen övervintrar till stor del i Östersjöns södra delar. Utbytet av individer med andra fågelstammar är sannolikt ringa och östersjöfåglarna kan betraktas utgöra en relativt isolerad stam.

Tordmulen lever av fisk, främst sill och skarpsill, som fångas i fritt vatten utomskärs eller i större fjärdar.

Tordmulen häckar på öar i ytterskärgården, oftast i kolonier. Bona placeras i sprickor i berget eller i anhopningar av större stenar. Det enda ägget läggs i slutet av maj eller i början av juni och ungen lämnar boet i andra halvan av juli. I synnerhet de största kolonierna har stor betydelse för beståndets fortlevnad och därmed högt skyddsvärde.

Tordmulens bestånd i Östersjön reducerades ytterst kraftigt under isvintrarna 1939-1940 och 1941-1942 (Wahlin 1944) då stora delar av Östersjön frös till. En långsam återhämtning har sedan skett men nuvarande bestånd utgör bara en tredjedel av 1930-talets (Andersson m fl 1978). Den låga reproduktionstakten innebär att omfattande dödlighet av vuxna fåglar tar årtionden att återhämta. Under 1979-talet har en viss beståndsökning noterats.

Sillgrisslan häckar i Nordatlanten och angränsande delar. I Sverige förekommer arten häckande på Stora och Lilla Karlsö vid Gotland samt i mindre antal på enstaka utskär i Skåne, Södermanland, Uppland och Ångermanland. Östersjöbeståndet uppskattades i början av 1970-talet till ca 8 800 par varav ca 7 700 i Sverige (Hedgren 1975). Övervintring sker huvudsakligen i södra Östersjön.

BESLUT

Datum
1982-03-12

Ert datum

Beteckning
11.122-712-81
Er beteckning 0188

Häckningsplatserna är belägna på höga klippor eller under stenblock vid havet. Vanligen är sillgrisslan kolonihäckande. Det enda ägget läggs vanligen i maj och ungen lämnar häckningslokalen i slutet av juli.

Östersjöns sillgrisslor är unika i den mening att de häckar i ett innanhav med bräckt vatten och inte i rent marin miljö. En ökning av stammen har skett under de senaste årtiondena.

Sillgrisslan har liksom tordmulen låg reproduktionstakt vilket innebär att omfattande dödlighet av vuxna fåglar tar årtionden att återhämta. Då antalet sillgrisslelokaliter är så begränsat måste häckplatserna ges högt skyddsvärde.

Syftet med fågelskyddsområdet är att skydda tordmulen och sillgrisslan, men även övrigt fågelliv inom ögruppen under häckningstid.

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 14 § tredje stycket naturvårdslagen Abborren samt vattenområdet 100 m från stranden som fågelskyddsområde. Området är utmärkt på bifogad karta.

Föreskrifter och förvaltningsbestämmelser för fågel- skyddsområdet

Föreskrifter

För att trygga ändamålet med fågelskyddsområdet förordnar länsstyrelsen med stöd av 15 § samt 3 och 17 §§ naturvårdsförordningen att nedanstående föreskrifter samt vård och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande området.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar skall förbud gälla att

1. under tiden 1 april - 31 juli landstiga eller uppehålla sig inom 100 m från stranden av ön Abborren.
2. jaga eller medföra jaktredskap inom fågelskyddsområdet under tiden 1 april - 31 juli med undantag av jakt på tillfälligt inkommen räva, grävling eller mink enligt länsstyrelsens anvisningar.

BESLUT

Datum
1982-03-12
Ert datumBeteckning
11.122-712-81
Er beteckning 0188

3. medföra hund inom fågelskyddsområdet under tiden 1 april - 31 juli.
4. skada ägg eller bo samt att ofreda djur inom fågelskyddsområdet.

Föreskrifterna gäller även markägaren.

Föreskrifterna skall ej medföra hinder för statlig tjänsteman att utföra nödvändig tjänsteutövning. Samråd skall därvid ske med länsstyrelsen.

Förvaltningsbestämmelser

Fågelskyddsområdet skall ur naturvårdssynpunkt tills vidare förvaltas av länsstyrelsen.

Fågelskyddsområdet skall utmärkas av skogsvårdsstyrelsen enligt de anvisningar som utfärdats av statens naturvårdsverk.

Tillsyn av fågelskyddsområdet sker genom Tullverkets Kustbevakning.


Kontroll av beståndets storlek skall genom länsstyrelsens försorg regelbundet ske enligt den inventeringsmetodik som finns utarbetad (Landstingets naturresursinventering). Ringmärkning av fågelbeståndet bör regelbundet genomföras. Detta skall bl a tjäna som underlag för att bedöma framtida förändringar av bestånden i skärgården samt eventuella omfattande oljeskador som drabbar bestånden.

Naturvårdsförvaltaren eller Kustbevakningen skall efter samråd med länsstyrelsen snarast avliva tillfälligt inkommen räv, grävling eller mink.

Vid klagan över detta beslut skall besvär anföras hos jordbruksdepartementet enligt bilaga (formulär H).

I handläggningen av detta ärende har deltagit byrådirektör Ragnar Janson, beslutande, länsassessor Karl-Henrik Ziefvert samt förste byråingenjör Björn Hjernquist, föredragande.


Ragnar Janson


Björn Hjernquist

LÄNSSTYRELSEN
Stockholms län

BESLUT

Datum
1982-03-12
Ert datum

Beteckning
11.122-712-81
Er beteckning 0188

Bilagor

Karta över fågelskyddsområdet
Besvärshänvisning (formulär H)

SÄNDLISTA

Sändlistan är borttagen i denna version
eftersom den innehåller personuppgifter.

res

E

KVITTO

S LÄN

MOTTAGNINGST

Akten 2 ex
Registret
Karl-Henrik Ziefvert
Juridiska enheten
Lantmäterienheten
Stockholms läns författningssamling, länskungörelserna

Besöksadress
Hantverkargatan 29

Telefon
08 - 785 40 00

Postgirokonto
3 51 72 - 6

HOLM

FÅGELSKYDDSSOMRÅDE ABBORREN




Bilaga 1

Tillhör länsstyrelsens
beslut 11. 122-712-81.

Teckenförklaring

— Tillträdesförbud till land-
och vattenområde under tiden
1.4 - 31.7

Skala 1:10 000



ÖVERSIKTSKARTA