

Rickleå-Ratankusten - NRO24082

Areal: 3 844 ha

Kartblad: 21K, L

Kommun: Robertsfors

Riksvärde: Geovetenskap

Kustområdet Rickleå - Ratan är en omkring 20 km lång sträcka strax sydost om Robertsfors. Stormorfologin karaktäriseras av slätter samt vågig terräng med låga kullar. Området har i sin helhet legat under högsta kustlinjen (HK) och består, särskilt i dalgångarna av finkorniga sorterade jordar som sand, mo och lera. Klapper och strandgrus täcker de öppet liggande bergens lägre delar, medan de högre partierna är renspolade och visar berg i dagen. Kustområdet har en måttligt bruten strandlinje men med många små uddar och vikar samt relativt få ganska kustnära öar. Båkskäret och Nördklubben utanför Ratan är de största öarna och stränderna är omväxlande alltifrån hållar och klappersten till grus och finsediment. På Båkskär finns stora sammanhängande hållområden. Vattenståndsmärken från 1749 vid Ratan dokumenterar landhöjningens förlopp. Kustgranskogen skiljs vanligen från stranden av en bård av gråal. På hållmarkerna växer enbuskar och gran samt ris som ljung, lingon, kråkris och odon. Strandhållarna är lavtäckta. Andra strandtyper som dominerar är gräs, starr, säv och tågväxter med inslag av örter. Pors växer här och var på de högre delarna av stränderna. Gultåtel, som är en endemisk art för Bottenviken, finns längs hela kuststräckan. Andra vanliga strandväxter är t.ex. madrör, blåsäv, knappsäv och östersjötåg. Bland örterna kan nämnas strandglim, strandärt och strandkämpar. Vattenväxten trubbpilblad finns i en riklig förekomst i Dalkarlså nära sin sydgräns i Sverige. På öarna vid Ricklefjärden finns kolonier av fiskmå, silvertärna och tobisgrissla. Vigg är också en vanlig häckfågel. Rastande stor- och småkrakar kan också finnas här i stort antal.